

Wirkstoff	Beispiele für Handelspräparate	Wirkung	Indikation
Atropin	Atropinsulfat (0,5 mg/ml Inj.-Lsg.) $\oplus$ (B. Braun), Atropinsulfat (10 mg/ml Inj.-Lsg.) $\oplus$ (Köhler), Atropinum sulfuricum (0,25 mg/–0,5 mg/–1 mg/ml Inj.-Lsg.) $\oplus$ (Eifelango), Dysurgal (0,5 mg/Tabl.) $\oplus$ (MaxMedic)	Parasympatholytikum	a) Narkoseprämedikation b) Sinusbradykardie c) Bronchospasmen d) Organophosphatvergiftung e) Reanimation bei vaginal vermitteltem Arrest
Aurothiomalat, Natriumau-rothiomalat	Tauredon (10 mg/–20 mg/–50 mg/Tabl.) $\oplus$ (Takeda)	nichtsteroidales Antiphlogistikum, Immunsuppressivum	Autoimmunkrankheiten wie Pemphigus, Pemphigoid, systemischer Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis
Azaperon	Stresnil (40 mg/ml Inj.-Lsg.) $\oplus$ $\oplus$ (Elanco Animal Health)	Neuroleptikum, Sedativum	Sedation, Aggressivität, zur Beruhigung
Azathioprin	Azafalk (25 mg/–50 mg/–75 mg/–100 mg/Tabl.) $\oplus$ (Falk), Imurek (25 mg/–50 mg/Tabl.) $\oplus$ (Aspen Pharma)	Immunsuppressivum, Zytostatikum, Purinantagonist	Autoimmunkrankheiten wie Pemphigus, Lupus erythematodes, chronische Hepatitis, Glomerulitis, AIHA, idiopathische Thrombozytopenie, chronische Polyarthrit
Azathioprin [A] + Prednisolon [P]	[A]: s. oben [P]: Prednisolon (5 mg/Tabl.) $\oplus$ (aniMedica, CP-Pharma), Prednisolon (50 mg/Tabl.) $\oplus$ $\oplus$ (CP-Pharma)	Immunsuppressivum	Autoimmunkrankheiten
Ballaststoffe, s. auch Weizenkleie	Indische Flohsamenschalen: Flosine Balance (600 mg/g Granulat) $\oplus$ (QUIRIS HEALTH-CARE), Metamucil (3,25 g/Beutel) $\oplus$ (Wick Pharma), Pasco-mucil (500 mg/g Pulver) $\oplus$ (Pascoe)	Mucilaginosum, Erhöhung der Darballaststoffe	Colonträgheit, chronische Colondurchfälle, Colon irritabile, chronische Obstipation

Nebenwirkungen, Besonderheiten	Kontraindikationen	Dosis Hund	Dosis Katze
Tachykardie, Sekretionshemmung (Speichel, Magensaft, Bronchien), Magen-Darm-Hypomotilität, Bronchodilatation, Harnblasenatonie, Mydriasis, intraokuläre Drucksteigerung	Glaukom, Herzrhythmyarrhythmie	a) + b) 0,01–0,02 mg/kg, i. v., s. c. c) 0,04–0,08 mg/kg, i. v., s. c. d) 0,1 mg/kg, i. v., Wdh. nach klinischem Befund e) 0,04–0,05 mg/kg, alle 5 min i. v., i. o., intratracheal	a) + b) 0,01–0,02 mg/kg, i. v., s. c. c) 0,04–0,08 mg/kg, i. v., s. c. d) 0,1 mg/kg, i. v., Wdh. nach klinischem Befund
Schleimhautreizung, Hämatopoesestörung, Nierenschädigung (vereinzelt)	Hämatopoesestörung, Leber-, Niereninsuffizienz	je nach Größe 5–20 mg/Hund, i. m., 1 × wöchentlichl.	5 mg/Katze, i. m., 1 × wöchentlichl.
ggr. Hypotonie, Salivation, Hyperpnoe	nicht bekannt, Anwendung bei Katzen	0,1–1 mg/kg, i. m.	–
Knochenmarkdepression (v. a. bei Katzen) mit Leukopenie, Anämie, Thrombozytopenie, Infektionsbereitschaft, Inappetenz, Vomitus, Diarrhoe, akute Pancreatitis, Hepatopathie, Haarverlust	akute Infektionskrankheiten, Hepatopathie, Gravidität, Dosisreduktion bei Nephropathie	1–2 mg/kg, p. o., 1 × tgl., nach Remission Reduktion auf < 1 mg/kg, evtl. jeden 2. Tag	1–2 mg/kg, p. o., 1 × tgl.
s. Azathioprin und Prednisolon	s. Azathioprin und Prednisolon	[A] 0,5–1 mg/kg + [P] 0,5–1 mg/kg, p. o., 1 × tgl.	[A] 0,5–1 mg/kg + [P] 0,5–1 mg/kg, p. o., 1 × tgl.
Meteorismus, auf ausreichende Wasserversorgung achten	lleus	1–3 Teel. ins Futter	1 Teel. ins Futter

☐/☐ = für Hund/Katze umwidmen

**Dosierungsvorschläge** 23